# 治療スケジュール

J-145

| | |
|---|---|
| *レジメン名 | DLd療法(皮下)(1～2ｺｰｽ目)(28日間)(MM) |
| *投与量・投与日 | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ1800mg day1,8,15,22、ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ25mg/body day1～21、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ20mg/body day1,2,8,9,15,16,22,23 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(8) | d(15) | d(22) | d(28) | d( ) | d( ) | d( ) | d( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮下注射 | ☆ | ダラキューロ配合皮下注 | 1800 | mg | 3～5分 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 15mLを約3～5分かけて(翼状針を使用) | | | | | | | | | | | | |
| | | 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下(1,4,7,10時方向)に投与 | | | | | | | | | | | | |
| | | 投与部位は前回と同一部位を避けるため、時計回りに部位を変える。 | | | | | | | | | | | | |
| | | ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前にｶﾛﾅｰﾙ,ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ,ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ服用 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | | | | ● | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **以下別オーダー** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | ☆ | レナリドミドカプセル(5mg) | 25 | mg | day1～21 | | | | | | | | | |
| | | 1日1回　朝食後 | | | (day22～28休薬) | | | | | | | | | |
| | | レナリドミドはCCrに準じて減量。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | ☆ | レナデックス錠(4mg)　　(ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ) | 20 | mg | day1,2,8,9,15,16,22,23 | | | | | | | | | |
| | | １日１回　朝食後 | | | | | | | | | | | | |
| | | day1,8,15,22は、ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前に内服。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 75歳を超える又は過少体重(BMI18.5kg/㎡未満)ではﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝを20mg/週に減量。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | | カロナール錠(500mg) | 2 | 錠 | day1,8・15・22 | | | | | | | | | |
| | | ポララミン錠(2mg) | 1 | 錠 | day1,8・15・22 | | | | | | | | | |
| | | 1日1回 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | | | | | | | | | | | | | | |