治療スケジュール

J-24

*レジメン名	ERd療法（1ｺｰｽ目）（28日間）（MM）
*投与量・投与日	エロツズマブ10mg/kg day1.8.15.22　レナリドミド 25mg/day day1-21　レナデックス 28mg/day　day1.8.15.22

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液50mL	50	mL	15分	○	○	○	○			
		ポララミン注	5	mg		○	○	○	○			
		ファモチジン注	20	mg		○	○	○	○			
		デキサート注	6.6	mg		○	○	○	○			
		1日1回										
		点滴開始2時間前までにﾚﾅﾃﾞｯｸｽ内服										
		点滴開始時にｶﾛﾅｰﾙ内服										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	45分	○	○	○	○			
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液250mL	230	mL		○						
		注射用蒸留水100mL	1	本	(ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ溶解用)	○						
	☆	エムプリシティ	10	mg/kg	初め30分は30ml/hで開始、30～60分は60ml/h	○						
		1日1回			それ以後は120ml/h							
		生理食塩液250mLから20mL抜き230mLとして使用										
		0.22μmフィルター使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液250mL	230	mL			○					
		注射用蒸留水100mL	1	本	(ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ溶解用)		○					
	☆	エムプリシティ	10	mg/kg	IR歴なければ、初め30分は180ml/h		○					
		1日1回			以後240ml/h							
		生理食塩液250mLから20mL抜き230mLとして使用										
		0.22μmフィルター使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液250mL	230	mL				○	○			
		注射用蒸留水100mL	1	本	(ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ溶解用)			○	○			
	☆	エムプリシティ	10	mg/kg	IR歴なければ、300ml/hで開始可能			○	○			
		1日1回			300ml/hを超えないこと							
		生理食塩液250mLから20mL抜き230mLとして使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液50mL	50	mL	15分	○	○	○	○			
		1日1回										
		流し										
		休薬完了								●		
		以下別オーダ										
内服	☆	レブラミドカプセル(5mg)　(ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ)	25	mg	day1-21							
		1日1回　朝食後										
内服	☆	レナデックス錠(4mg)　(ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ)	28	mg	day1･8･15･22							
		1日1回　抗がん剤投与3時間前までに内服										
内服		カロナール錠(500mg)	500	mg	day1･8･15･22							
		1日1回　前投薬開始時内服										
内服		ビクロックス錠(200mg)	1	錠	予防内服							
		1日1回　朝食後										
内服		バイアスピリン錠(100mg)	1	錠	予防内服							
		1日1回　朝食後										
内服		ランソプラゾールOD錠(15mg)	1	錠	予防内服							
		1日1回　朝食後										