治療スケジュール

J-28

*レジメン名	オビヌツズマブ+B療法(1コース目)(28日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	オビヌツズマブ1000mg/body day1・8・15、ベンダムスチン90mg/㎡ day2・3

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(8)	d(15)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液250mL	250	mL	開始速度20mL/h	○	○	○	○	○			
		1日1回											
		投与速度適宜調整し、流しにも使用											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	30分	○		○	○	○			
		デキサート注射液	6.6	mg		○		○	○	○			
		1日1回											
		(day1・8・15)点滴開始時にカロナール・ポララミン内服											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	30分		○						
		アロキシ静注 0.75mg	1	V			○						
		デキサート注射液	6.6	mg			○						
		1日1回											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	30分	○			○	○			
		1日1回											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液250mL	210	mL	(day1)12.5mL/hで開始	○			○	○			
	☆	ガザイバ点滴静注	1000	mg/body	(day8・15)25mL/hで開始可	○			○	○			
		1日1回											
		生食250mLから40mL抜き、210mLとして使用											
		(day1)12mL/hで開始、30分毎up(12→25→37→50→62→75→87→100mL/h)、最大100mL/h											
		(day8・15) 前回の投与でIRがgrade1以下の場合、医師の指示によって25mL/hで開始可能、 30分毎25mL/h up、最大100mL/h											
		0.2又は0.22μmフィルター使用											
		無菌製剤処理料1											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液250mL	250	mL	1時間		○	○					
		注射用蒸留水　100mL	1	本	(トレアキシン溶解用)		○	○					
	☆	トレアキシン点滴静注用	90	mg/㎡			○	○					
		1日1回											
		無菌製剤処理料1(揮発性)											
		休薬完了									●		
		以下別オーダー											
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1・8・15								
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1・8・15								
		1日1回　ガザイバ投与30分前											
内服		ビクロックス錠(200mg)	1	錠	day1-28								
		1日1回 朝食後											
内服		バクタ配合錠	1	錠	day1-28								
		1日1回 朝食後											
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day4・5								
		1日2回 朝昼食後											