

治療スケジュール

J-29

| *レジメン名 | オビヌツスマブ+B療法(2~6コース目)(28日間)(悪性リンパ腫) | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----|-------------------|-------------|------|------|-------|------|------|
| *投与量・投与日 | ガザイバ1000mg/body day1、トリアキシン90mg/m ² day1・2 | | | | | | | | | |
| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・*コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(2) | d(28) | d() | d() |
| 通常点滴注射 | メインルート | 生理食塩液250mL 1日1回 投与速度適宜調整し、流しにも使用 | 250 | mL | 開始速度20mL/h | ○ | ○ | | | |
| 側管点滴注射 | メインルート | 生理食塩液100mL アロキシン静注 0.75mg デキサート注射液 1日1回 点滴開始時にカロナール・ホラミン内服 | 100 | mL | 30分 | ○ | ○ | | | |
| 側管点滴注射 | メインルート | 生理食塩液100mL 1日1回 | 100 | mL | 30分 | ○ | | | | |
| 側管点滴注射 | メインルート | 生理食塩液100mL デキサート注射液 1日1回 | 100 | mL | 30分 | | ○ | ○ | | |
| 側管点滴注射 | メインルート | 生理食塩液250mL ☆ ガザイバ点滴静注 1日1回 生食250mLから40mL抜き、210mLとして使用 前回の投与でIRがgrade1以下の場合、医師の指示によって25mL/hで開始可能、30分毎25mL/h up、最大100mL/h 0.2又は0.22µmフィルター使用 無菌製剤処理料1 | 210 | mL | 25mL/hで開始可能 | ○ | ○ | | | |
| 側管点滴注射 | メインルート | 生理食塩液50mL 1日1回 点滴開始時トリアキシンの調製を薬剤部に依頼 | 50 | mL | 30分 | ○ | | | | |
| 側管点滴注射 | メインルート | 生理食塩液250mL 注射用蒸留水 100mL ☆ トリアキシン点滴静注 1日1回 無菌製剤処理料1(揮発性) 休薬完了 | 250 | mL | 1時間 | ○ | ○ | | | |
| | | | 1 | 本 | (トリアキシン溶解用) | ○ | ○ | | | |
| | | | 90 | mg/m ² | | ○ | ○ | | | |
| | | | | | | | | | | ● |
| | | 以下別オーダー | | | | | | | | |
| 内服 | | カロナール錠(500mg) ホラミン錠(2mg) 1日1回 ガザイバ投与30分前 | 1 | 錠 | day1 | | | | | |
| 内服 | | ピクロックス錠(200mg) 1日1回 朝食後 | 1 | 錠 | day1-28 | | | | | |
| 内服 | | パクタ配合錠 1日1回 朝食後 | 1 | 錠 | day1-28 | | | | | |
| 内服 | | デカドロン錠(0.5mg) 1日2回 朝昼食後 | 16 | 錠 | day3-4 | | | | | |