治療スケジュール

J-34

*レジメン名	DBd療法(2～3ｺｰｽ目)(21日間)(MM)
*投与量・投与日	ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ16mg/kg：day1・8・15、ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ1.3mg/㎡：day1・4・8・11、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ20mg/body：(div)day1・8、(po)day2・4・5・9・11・12

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(4)	d(8)	d(11)	d(15)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液500mL	500	mL	開始時速度50mL/h	○		○		○			
		1日1回											
		投与速度適宜調整し、流しにも使用											
側管点滴注射メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	60分	○		○		○			
		デキサート注射液	19.8	mg		○		○		○			
		1日1回											
		点滴開始時にカロナール、ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ内服											
側管点滴注射メインルート		生理食塩液500mL	500	mL	1ｺｰｽ目のIR有無で異なる	○		○		○			
	☆	ダラザレックス点滴静注	16	mg/kg		○		○		○			
		1日1回											
		総量500mLに調製											
		(50→)100→150→200mL/h で											
		1ｺｰｽ目day1・8に100mL/h以上でIR無なら100mL/hで開始可											
		(1時間毎50mL/h up)　最大200mL/h											
		0.2又は0.22μmフィルター使用											
		無菌製剤処理料1											
皮下注射		生理食塩液20mL	1	A	(ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ溶解用)	○	○	○	○				
	☆	ベルケイド3mg	1.3	mg/㎡	数秒	○	○	○	○				
		1日1回											
		1Vあたり生食1.2mLで溶解											
		無菌製剤処理料1											
		休薬完了									●		
		以下別オーダー											
内服	☆	レナデックス錠(4mg)　　(ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ)	20	mg/day	day2.4,5,9,11,12(※)								
		1日1回　朝食後											
		※75歳を超える、過少体重(BMI：18.5kg・㎡未満)、ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良のDM又はｽﾃﾛｲﾄﾞ療法に対する忍容性がない、もしくは有害事象を発現した患者は省略可。											
内服		カロナール錠(500mg)	2	錠	day1・8・15								
		ポラプラミン錠(2mg)	1	錠	day1・8・15								
		1日1回 ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与60分前											
内服		ビクロックス錠(200mg)	1	錠	day1-21								
		1日1回 朝食後											
内服		バクタ配合錠	1	錠	day1-21								
		1日1回 朝食後											