治療スケジュール

J-43

*レジメン名	ﾌﾟﾗﾗﾄﾚｷｻｰﾄ療法(49日間)(PTCL)
*投与量・投与日	ﾌﾟﾗﾗﾄﾚｷｻｰﾄ 30mg/㎡ day1・8・15・22・29・36

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(29)	d(36)	d(49)	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液250mL	250	mL	開始速度20mL/h	○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
		投与速度適宜調整し、流しにも使用											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	30分	○	○	○	○	○	○		
		デキサート注	6.6	mg		○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液50mL	50	mL	5分	○	○	○	○	○	○		
	☆	ジフォルタ注	30	mg/㎡		○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		休薬完了										●	
		以下別オーダ											
内服		パンビタン末	2	g	初回投与10日以上前～治療終了後30日間　連日投与								
		1日1回											
筋肉内注射		メコバラミン注500μg	2	A	初回投与10日以上前～ 8～10週ごと筋注								