治療スケジュール

J-45

*レジメン名	ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ+AVD療法(28日間)(ホジキンリンパ腫)
*投与量・投与日	ドキソルビシン25mg/㎡、ビンブラスチン6mg/㎡、ダカルバジン375mg/㎡、アドセトリス1.2mg/kg day1.・15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(15)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	ml		○	○			
		グラニセトロン静注液	1	mg		○	○			
		デキサート注射液	9.9	mg	30分	○	○			
		1日1回								
		点滴開始1時間前にアプレピタント内服								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml		○	○			
	☆	ドキソルビシン注	25	mg/㎡	30分	○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml		○	○			
	☆	エクザール注	6	mg/㎡	5分	○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml		○	○			
	☆	ダカルバジン注	375	mg/㎡	15分	○	○			
		注射用水	100	ml						
		1日1回								
		点滴回路全般を遮光して投与(専用遮光袋使用)								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○	○			
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml		○	○			
	☆	アドセトリス注	1.2	mg/kg	30分	○	○			
		注射用水	100	ml						
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	全開	○	○			
		1日1回								
		流し								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	day1,15					
		1日1回 1本目の点滴開始1時間前								
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	day2-3,16-17					
		1日1回 朝食後								
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day2-4・16-18					
		1日2回 朝昼食後								
皮下注射		フィルグラスチムBS注	50	μg/㎡						
		1日1回 抗がん剤投与終了後24時間以降に投与								