治療スケジュール

J-46

*レジメン名	FCR療法(28日間)(CLL)
*投与量・投与日	リツキサン375mg/㎡ d1、フルダラ25mg/㎡ d2-4、 エンドキサン250mg/㎡ d2-4

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(6)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○								
		1日1回												
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	375	mL/㎡	50→100→150mL/hで	○								
	☆	リツキサン注	375	mg/㎡	(30分毎50mL/h up)	○								
		1日1回												
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)												
		リツキサン1mg/mLに濃度調整												
		リツキサン投与30分前にカロナール、ポララミン服用												
		最大投与速度400mL/h												
		無菌製剤処理料1												
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○								
		1日1回												
		流し												
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○	○	○					
		グラニセトロン注1mg	1	A			○	○	○					
		デキサート注6.6mg	1	mg			○	○	○					
		1日1回												
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○	○	○					
	☆	フルダラ注	25	mg/㎡			○	○	○					
		1日1回												
		無菌製剤処理料1												
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	2時間		○	○	○					
	☆	エンドキサン注	250	mg/㎡			○	○	○					
		1日1回												
		無菌製剤処理料1(揮発性)												
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○	○					
		1日1回												
		流し												
		休薬完了										●		
		以下別オーダー												
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1	○								
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1	○								
		1日1回　リツキサンの30分前に												
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day5･6					○	○			
		1日2回　朝昼食後												
内服		ビクロックス錠(200mg)	1	錠	day1～28									
		1日1回　朝食後												
内服		バクタ配合錠	1	錠	day1～28									
		1日1回　朝食後												