

レジメン登録フォーマット

J-57

*レジメン名	R-GCD療法(IR無)(21日間)(悪性リンパ腫)							
*投与量・投与日	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> day1,8, カルボプラチン AUC=5 day1, リツキシマブ 375 mg/m <sup>2</sup> day8, デカドロン40mg day1-4							
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(21)
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		
		パロノセトロン注	0.75	mg		○		
		デキサート注	33	mg		○		
		1日1回						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分		○	
		デキサート注	6.6	mg			○	
		1日1回						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	337.5	mL/m <sup>2</sup>	100→200→300mL/hで		○	
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/m <sup>2</sup>	(30分毎100mL/h up)		○	
		100→200→300mL/hで(30分毎100mL/h up)						
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整						
		リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用						
		最大投与速度400mL/h						
		1日1回						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分		○	
		1日1回						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○	○	
	☆	ゲムシタピン	1000	mg/m <sup>2</sup>		○	○	
		1日1回						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射	メインルート	5%ブドウ糖液	250	mL	1時間	○		
	☆	カルボプラチン	5	AUC		○		
		1日1回						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○	
		1日1回						
		流し						
		休薬完了						●
		以下別オーダー						
		デカドロン錠	40	mg	d2-4			
		1日2回 朝昼食後						
		カロナール錠(200mg)	2	錠	day8			
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day8			
		1日1回 リツキシマブの30分前に						