治療スケジュール

J-64

*レジメン名	DeVIC療法(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	エトポシド 100 mg/㎡ day1-3, イホスファミド 1500 mg/㎡ day1-3, ウロミテキサン 300 mg/㎡ day1-3, カルボプラチン 300 mg/㎡ day1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(21)	d()	d()	d()	d()
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	100	mL		○							
		グラニセトロン注	1	mg		○							
		デキサート注	33	mg		○							
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○							
		1日1回											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○	○					
		グラニセトロン注	1	mg			○	○					
		デキサート注	33	mg			○	○					
		1日1回											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	○	○					
	☆	エトポシド注	100	mg/㎡		○	○	○					
		1日1回											
		エトポシド濃度0.4mg/mLを超えると結晶析出の恐れがある											
		ため0.4mg/mL以下になるよう生食追加											
		無菌製剤処理料1											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○					
		1日1回											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	3時間	○	○	○					
	☆	注射用イホマイド	1500	mg/㎡		○	○	○					
		無菌製剤処理料1(揮発性)											
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○					
		ウロミテキサン注	*	mg/㎡		○	○	○					
		1日1回											
		イホマイド投与開始時に側管投与											
		ウロミテキサンはイホマイドの投与量の20%を1回量とする											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
中心静脈注射 メインルート		5%ブドウ糖液	250	mL	30分	○							
	☆	カルボプラチン注	300	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○					
		1日1回											
中心静脈注射 メインルート		ウロミテキサン注	*	mg/㎡	30分	○	○	○					
		生理食塩液	100	mL		○	○	○					
		1日1回											
		イホマイド投与開始4時間後から投与											
		ウロミテキサンはイホマイドの投与量の20%を1回量とする											
中心静脈注射 メインルート		ウロミテキサン注	*	mg/㎡	30分	○	○	○					
		生理食塩液	100	mL		○	○	○					
		1日1回											
		イホマイド投与開始8時間後から投与											
		ウロミテキサンはイホマイドの投与量の20%を1回量とする											
		休薬完了							●				
皮下注射		フィルグラスチムBS注	75	μg/bod	day4以降、顆粒球が治療前値に回復するまで投与								
		1日1回			day4は夕方(カルボプラチン投与終了24時間後)、day5以降は午前中								