# 治療スケジュール

J-92

| | |
|---|---|
| *レジメン名 | DLd療法(皮下)(7コース目以降)(28日間)(MM) |
| *投与量・投与日 | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ1800mg day1、ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ25mg/body day1～21、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ20mg/body day1,2,8,9,15,16,22,23 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮下注射 | ☆ | ダラキューロ配合皮下注 | 1800 | mg | 3～5分 | ○ | |
| | | 1日1回 | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | |
| | | ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前にｶﾛﾅｰﾙ,ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ,ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ服用 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | ● |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | **以下別オーダー** | | | | | |
| | | | | | | | |
| 内服 | ☆ | レブラミドカプセル(5mg) (ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ) | 25 | mg | day1～21 | | |
| | | 1日1回 朝食後 | | | (day22～28休薬) | | |
| | | レブラミドはCCrに準じて減量。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 内服 | ☆ | レナデックス錠(4mg) (ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ) | 20 | mg | day1,2,8,9,15,16,22,23 | | |
| | | 1日1回 朝食後 | | | | | |
| | | day1は、ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前に内服。 | | | | | |
| | | 75歳を超える又は過少体重(BMI18.5kg/㎡未満)ではﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝを20mg/週に減量。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 内服 | | カロナール錠(500mg) | 2 | 錠 | day1 | | |
| | | ポララミン錠(2mg) | 1 | 錠 | day1 | | |
| | | 1日1回 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |