治療スケジュール

J-93

*レジメン名	CAG療法(21日間)(AML)
*投与量・投与日	アクラルビシン 14 mg/㎡ day1-4, シタラビン 20mg/㎡ day1-14, フィルグラスチム 200μg/㎡ day1-14

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(6)	d(7)	d(8)	d(9)	d(10)	d(11)	d(12)	d(13)	d(14)	d(21)
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○	○											
		グラニセトロン注	1	mg		○	○	○	○											
		1日1回																		
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		メトクロプラミド注	10	mg						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		1日1回																		
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○	○											
	☆	アクラシノン注	14	mg/㎡		○	○	○	○											
		1日1回																		
		無菌製剤処理料1																		
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	24時間	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	☆	キロサイド注	20	mg/㎡		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		1日1回																		
		フィルグラスチムと同ルートで投与可																		
		無菌製剤処理料1																		
		休薬完了																		●
		以下別オーダー																		
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	24時間	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		フィルグラスチム注	200	μg/㎡		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		1日1回																		
		白血球数10,000/μL以上の場合は投与しない																		
		(キロサイドと同ルートで投与可)																		