

治療スケジュール

K-6

| | |
|----------|--|
| *レジメン名 | ゲムシタビン+ドセタキセル療法(21日間)(軟部腫瘍) |
| *投与量・投与日 | Gemcitabine 900mg/m ² d-1, d-8 Docetaxel 100mg/m ² d-8 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(8) | d(21) | d() | d() | d() | d() | d() |
|---------------|---|---------------------|-----|-------------------|-----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 100 | mL | 30分 | ○ | | | | | | | |
| | | デキサート注射液 | 6.6 | mg | | ○ | | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 100 | mL | 30分 | | ○ | | | | | | |
| | | デキサート注射液 | 9.9 | mg | | | ○ | | | | | | |
| | | パロノセトロン静注0.75mg | 1 | V | | | ○ | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 100 | mL | 90分 | ○ | ○ | | | | | | |
| | ☆ | ゲムシタビン | 900 | mg/m ² | | ○ | ○ | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | | ○ | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 5%ブドウ糖液 | 250 | mL | 60分 | | ○ | | | | | | |
| | ☆ | ドセタキセル | 100 | mg/m ² | | | ○ | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | ○ | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | 流し | | | | | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | | | | ● | | | |