*レジメン名	ニボルマブ+イピリムマブ療法(21日間)(悪性黒色腫)
*投与量・投与日	ニボルマブ80mg/body d1、イピリムマブ3mg/kg d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○									
		1日1回													
		ルート確保													
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○									
	☆	オプジーボ注	80	mg/body		○									
		1日1回													
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用													
		無菌製剤処理料1													
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○									
		1日1回													
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	90	mL	30分	○									
	☆	ヤーボイ注	3	mg/kg		○									
		1日1回													
		生食100mLから10mL抜き、90mLとして使用													
		0.2-1.2μmのインラインフィルターを使用													
		無菌製剤処理料1													
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○									
		1日1回													
		流し													
		休薬完了					●								